Appendix S2: Clinical efficacy in terms of re-pigmentation along with no response with handheld NB-UVB device-based therapy in the included studies.

Study	3months				4months				5months				6months				9 Months				12 months				No response /worsen
	1-25%	25-50%	>50 %	>75 %	<25 %	25-50%	>50 %	>75 %	<25 %	25-50%	>50 %	>75 %	<25 %	25-50%	>50 %	>75 %	<25 %	25-50%	>50 %	>75 %	1-25%	25-50%	>50 %	>75 %	
Singh S *et al* [8]					1 (7.4 %)	8 (57.14%)	4 (28.6 %)	3 (21.4 %)																	1 (7.14 %)
Poolsuwan P *et al.* [19]							11 (30.5 %)	5/36 (13.89%)																	NS
Khandpur S *et al.* [10]													0	2 (20 %)	7 (70 %)	1 (10 %									1 (10 %)
Thomas *et al.[*13]				6 (4%)												6 (5%)				11 (10 %)					NS
Zhang L *et al.* [15]	28 (65 %)	7 (16 %)	0	0									2 (5%)	12(32%)	18 (47 %)	2 (5%)									6 (15.8 %)
Liu B *et al.*[16]									19 (36.5 %)	6 (11.5 %)	23 (44.2 %)	12 (23.1 %)													4 (7.6 %)
Van TN *et al.[*17]	0	3 (18.7 %)	10 (62.5 %)	6 (37.5 %)																					3 (18.7 %)
Tien Guan ST *et al.* [18]															16 (72.7 %)	11 (50 %)									3 (13.6 %)
Shan X *et al.* [12]	42 (45 %)	17 (18.2 %)	17 (18.2 %)	8 (8.6 %)									34 (36.5 %)	14 (15 %)	34 (36.5 %)	21 (22.5 %)	24 (25.8 %)	15 (16.1 %)	43 (46.2 %)	33 (35.4 %)	16 (17.2 %)	15 (16.1 %)	51 (54.8 %)	35 (37.63%)	11 (11.8 %)
Elefthe riadou V *et al.* [14]					8 (47 %)	1 (6%)	2 (12 %)	2(12 %)																	6 (35.2 %)
Goel S *et al.* [11]													12 (24 %)	15 (30 %)	23 (46 %)	0									0
Klahan S, Asawanonda P [21]			2 (15 %)	0																					1 (6.6 %)
Asawanonda *et al.* [20]	3 (30 %)	2 (20 %)	0	0									3 (42.8 %)	2 (28.5 %)	0	0									2 (28.5 %)